

Lietošanas instrukcija: informācija zāļu lietotājam

BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā *Salviae folii extractum fluidum, Thymi herbae extractum fluidum*

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
- Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
- Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.
- Ja pēc 7 dienām nejutaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir *BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā* un kādam nolūkam to lieto
2. Kas Jums jāzina pirms *BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā* lietošanas
3. Kā lietot *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā*
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā*
6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir *BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā* un kādam nolūkam to lieto

BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā ir augu izcelsmes zāles mutes dobuma un rīkles iekaisuma (piemēram, sāpes rīklē, aizsmakums un apgrūtināta rīšana) simptomātiskai ārstēšanai. Zāles ir tradicionāli lietotas augu izcelsmes zāles ar noteiktām indikācijām, kas balstītas vienīgi uz ilgstošu lietošanu.

Izsmidzināšana nodrošina vienmērīgu un plānu aktīvo vielu pārklājumu, kā arī mērķtiecīgu skarto vietu apstrādi.

***BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā* lieto** mutes dobuma un rīkles iekaisumu gadījumā.

2. Kas Jums jāzina pirms *BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā* lietošanas

Nelietojiet *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā* šādos gadījumos ja Jums ir alerģija pret salviju, timiānu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

- Neiesmidzināt acīs vai degunā.
- Neiesmidzināt atklātās liesmās.

Ja sūdzības saglabājas vai ārstēšana nesniedz gaidītos panākumus, konsultējieties ar ārstu pēc iespējas ātrāk.

Bērni

Lietošana bērniem un pusaudžiem, kas jaunāki par 18 gadiem nav ieteicama.

Citas zāles un *BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā*

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.

Salvijas lapas saturošu līdzekļu lietošana var ietekmēt barbiturātu, benzodiazepīnu iedarbību, tādēļ vienlaicīga lietošana ar šīm zālēm nav ieteicama.

BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā kopā ar uzturu un dzērienu
Dati par uztura vai dzēriena ietekmi uz šo zāļu iedarbību nav pieejami.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Lietošana grūtniecības un zīdīšanas perioda laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Īpaša piesardzība nav nepieciešama.

BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā satur etilspirtu

Šīs zāles satur mazu daudzumu etilspirta (alkohola), mazāk nekā 100 mg atsevišķā devā.

3. Kā lietot BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis(-kusi). Neskaidrību gadījumā vaicāriet ārstam vai farmaceitam.


Ieteicamā deva ir:

Ja ārsts nav noteicis citādāk, lietojiet mutes dobumā un rīklē 1 līdz 2 izsmidzinājumus ik pēc 1,5 līdz 3 stundām (maksimāli 10 izsmidzinājumi dienā). Nelietojiet ilgāk par vienu nedēļu.

Konsultējieties ar savu ārstu vai veselības aprūpes speciālistu, ja *BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā* lietošanas laikā saglabājas simptomi, vai novērojat kādu nevēlamu blakusparādību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā.

Lietošanas veids

- Paceliet aerosola sūkņa grozāmo sprauslu taisnā leņķī pret pudeli (skatīt zīmējumu).
- Jūs tagad variet turēt sprauslu atkarībā no vajadzības un vēlamās apstrādes vietas mutes dobuma priekšā vai atvērta mutē. Pat grūtas piekļuves vietas (piemēram, zobus aptverošās smaganas) ar aerosola sūkņa sprauslu ir viegli sasniedzamas.
- Iesmidziniet *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā*, nospiežot vienu vai divas reizes.
- Aizveriet aerosola sūkni pēc katras lietošanas, pagriežot uzgali atpakaļ (skatīt zīmējumu).



Ja esat lietojis BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā vairāk nekā noteikts

Nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai dodieties uz tuvākās slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Paņemiet līdzi kastīti un šo instrukciju,

Ja esat aizmirsis lietot *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā*
Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja pārtraucat lietot *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā*
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Alkohola satura dēļ retos gadījumos iekaisuma vietās var būt īslaicīga dedzināšanas sajūta.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt *BRONCOPHEN AER aerosolu izsmidzināšanai mutes dobumā*

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Aerosola uzglabāšanas laiks pēc pirmās atvēršanas ir 8 nedēļas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes pēc "Derīgs līdz:". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem vai kanalizācijā. Vaicājiet farmaceitam par nevajadzīgo zāļu likvidēšanu. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko *BRONCOPHEN AER aerosols izsmidzināšanai mutes dobumā* satur

Aktīvās vielas ir salvijas lapu šķidrās ekstrakts un timiāna lakstu šķidrās ekstrakts.

1 izsmidzinājums (126 mg) satur aktīvās vielas:

Salvijas lapu šķidrās ekstrakts (*Salviae folii extractum fluidum*) (1 : 4-6, ekstrakts 70% (tilp.%) etilspirts) 40,32 mg

Timiāna lakstu šķidrās ekstrakts (*Thymi herbae extractum fluidum*) (1 : 4-6, ekstrakts 70% (tilp.%) etilspirts) 40,32 mg

1 g *BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā* satur:

Salvijas lapu šķidrās ekstrakts (*Salviae folii extractum fluidum*) 0,32 g

Timiāna lakstu šķidrās ekstrakts (*Thymi herbae extractum fluidum*) 0,32 g

Palīgvielas ir: piparmētras lapu šķidrās ekstrakts, mentols, saharīna nātrija sāls (E 954), hidroksipropilmetilceluloze, etilspirts (60%).

BRONCOPHEN AER aerosola izsmidzināšanai mutes dobumā ārējais izskats un iepakojums

Brūns, dzidrs šķīdums ar raksturīgu smaržu (piparmētru).

Dzintara krāsas stikla iepakojums (uzpildes tilpums 15 ml) ar dozējošu sūkni un izsmidzinātāja sprauslu. Iepakojumā 1 aerosols.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21
1160 Vienna
Austrija

**Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi akceptēta
04/2015**